

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 28-8-78030557

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Chemin d'Artigues, 33150 CENON - Tél. 86-22-75 - 86-24-35

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 Francs

Trésor-Région d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. 1 BORDEAUX 6702-46 X

25 AOUT 1978 - BULLETIN TECHNIQUE N° 24

VITICULTURE

MILDIOU

La sécheresse persistante va stopper l'évolution de quelques taches récentes observées dans certains vignobles.

Cependant à l'approche de la véraison, une dernière intervention est recommandée pour protéger le feuillage qui redevient sensible en fin de saison et favoriser le bon aoûtement des bois.

BLACK-ROT

Le traitement dirigé contre le mildiou permettra de combattre également le black-rot.

OIDIUM

Dans les cépages sensibles, les attaques d'oïdium sur grappes continuent à se manifester et pourront se poursuivre jusqu'à la pleine véraison. Une nouvelle intervention est donc conseillée dans les parcelles atteintes.

POURRITURE GRISE (BOTRYTIS)

Le troisième traitement spécifique peut être mis en place dès maintenant, la véraison débutant dans la plupart des cépages. Cependant dans les vignobles où l'on envisage de traiter le troisième vol d'Eudémis, on pourra retarder cette intervention pour effectuer un traitement mixte dirigé sur les grappes.

EUDEMIS

Les premières captures sont signalées dans quelques postes de piégeage mais il est encore trop tôt pour envisager de traiter la troisième génération. Attendre un prochain avis.

.../...

P 280

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES

Les températures actuelles sont favorables à la ponte et à l'incubation rapide des oeufs. Le traitement préconisé dans le bulletin précédent arrive en fin d'efficacité et une dernière intervention sera effectuée en veillant à bien respecter les délais d'emploi avant récolte.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER SUR POMMES ET POIRES

Dans les vergers de poiriers et pommiers situés au voisinage des vergers de pêchers, il est recommandé d'assurer une protection dans les prochains jours.

On choisira un produit efficace à la fois contre le carpocapse et la tordeuse orientale, à la dose prescrite contre ce dernier ravageur en respectant les délais d'utilisation avant récolte.

PHYLLOXERA DU POIRIER

Prévoir un quatrième traitement dans les derniers jours du mois d'Août.

MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES ET POIRES

Dans le bulletin n° 21 du 28 Juillet 1978 nous avons indiqué qu'une pluie "lessivante" survenant dans les 24 heures suivant une application de bénomyl diminue considérablement l'absorption du produit. En fait cette remarque s'applique aussi à carbendazime et méthylthiophanate appartenant au même groupe des benzimidazoles.

FEU BACTERIEN

Le Feu Bactérien vient d'être découvert dans plusieurs vergers de poiriers en Aquitaine. Une enquête est en cours pour localiser les foyers.

La maladie se présente actuellement de la façon suivante :

Sur les rameaux et les charpentières atteints, les feuilles semblent brûlées par le feu.

Les fruits des branches atteintes se momifient sur l'arbre.

Sous l'écorce, les tissus infectés, mais non encore totalement tués, présentent une striation brun rougeâtre brillante.

Pour nous aider dans notre enquête, nous demandons aux arboriculteurs qui observeraient des manifestations rappelant ces symptômes de bien vouloir informer immédiatement le Service local de la Protection des Végétaux.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"

L'Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : P. JOURNET
Inscription à la C.A.P.P.P. n° 524 AD

M. LARGE